CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Restauro das rotas migratórias de peixes potamódromos

O caso da ribeira da Vilariga

Isabel Boavida

CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra de Gamedada)
3835 km²

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra de Gomoneda)
3835 km²

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra de Gamoneda)
3835 km²

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra)
3835 km²

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra
3835 km²)

Rio Sabor

Rio Sabor

220 km (Sierra)
3835 km²

AH Baixo Sabor

Fonte: http://www.a-nossa-energia.edp.pt/centros_produtores

AH Baixo Sabor

Fonte: http://www.a-nossa-energia.edp.pt/centros_produtores

AH Baixo Sabor

Barragem Baixo Sabor

Barragem Feiticeiro

Migração piscícola

Source: Earth Satellite, Google Earth, Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNR Aero, IGN, USDA, USDA, USDA, AeroGRID, IGN, and the GIS User community

Fonte: http://www.a-nossa-energia.edp.pt/centros_produtores

Migração piscícola

Source: Earth Data Imageries, © 2015, Earthstar Geographics,
© ESRI, Inc., USA, DeLorme, © 2015, IGN, Esri, and the
local community.

1 0.5 0 1 Kilometers

Migração piscícola

Source: EarthDatalabs, © 2015, Earthstar Geographics,
© ESRI, Inc., USA, DeLorme, GeoEye, IGN, Aero
Geo, IGN, IGN, and the
User Community.

1 0.5 0 1 Kilometers

Migração piscícola

Source: EarthDatalabs, Esri, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

1 0.5 0 1 Kilometers

Ribeira da Vilarica

Source: Earth Datacube, Esri, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USDA/USFS/NRRI, IGN, and the
OpenStreetMap community.

1 0.5 0 1 Kilometers

Ribeira da Vilarica

Ribeira da Vilariação

Ribeira da Vilariação

Sistema adutor em canal submerso entre a albufeira da Barragem do Feiticeiro e a Ribeira da Vilariação de modo a aumentar o caudal do rio e a velocidade de corrente, atraindo assim a ictiofauna para a ribeira durante o período de reprodução.

1 0.5 0 1 Kilometers

Ações de requalificação

Canal de adução

Ações de requalificação

Açude submerso (enrocamento)

Ações de requalificação

Açude submerso (enrocamento)

Estabilização das margens

Ações de requalificação

Açudes

Açude submerso (enrocamento)

Estabilização das margens

Ações de requalificação

Açudes

Açude submerso (enrocamento)

Sequências riffle/run

Estabilização das margens

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Ações de requalificação

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Qual o caudal necessário à migração e desova?

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Framework

Framework

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Framework

Framework

Framework

Pesca elétrica

Deteção dos ovos

0.4 0.2 0 0.4 Kilometers

Medição das velocidades

Observação visual

4

2

8

5

0.4 Kilometers

Biologia

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

0.4 Kilometers

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Biologia

Designação do local	Coordenadas GPS	Distância á foz da Vilarça			
Variáveis de habitat	Procedimento	Registos espécies			
		Barbo 0+	Barbo >1+	Boga	Exóticas
Profundidade total	m				
Velocidade no fundo	Com o molinete a 5cm do fundo				
Velocidade média	A 40% de superfície				
Distância á margem mais próxima	m				
Vegetação submersa ou emergente	Escala 1 a 5				
Tipo de substrato dominante	Blocos %				
	Pedras %				
	Cascalho %				
	Gravilha/ saibro %				
	Areias/siltes %				
Matéria orgânica particulada (CPOM ou FPOM)	Escala 1 a 5				
Tipos de corrente	De acordo com descritores RHS				
Abrigo /ramos pendentes, vegetação aquática, blocos, ramos submersos)	Escala 1 a 5				

Framework

Levantamento topográfico

48 secções transversais

Modelação

Medições dos parâmetros hidráulicos e temperatura

ADCP (*Acoustic Doppler Current Profiler*)

Modelação

Rugosidade

Perfil longitudinal

Simulação

- HEC-RAS
- CASiMiRfish

$Q = 3.3 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q = 0.4 \rightarrow 20 \text{ m}^3/\text{s}$

Resultados

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Resultados

Factor Loadings (Varimax normalized): Principal components		
	Factor - 1	Factor - 2
Depth	0.34	0.17
Near bed velocity	0.39	-0.15
Average velocity	0.53	-0.56
Distance to the bank	0.29	0.24
Rocky bank	0.43	-0.56
Eroded bank	0.36	0.39
Stabilized bank	-0.79	-0.08
Shade	-0.20	0.57
Boulders	0.40	-0.03
Hanging trees	0.10	0.60
Submerged vegetation	0.52	0.00
Emerged vegetation	-0.15	-0.24
LWD	-0.15	0.48
Stand waves	-0.12	-0.37
Rippled flow	0.44	0.11
Upwelling	-0.39	-0.07
Smooth flow	-0.06	0.27
Silt	-0.23	0.08
Cobbles	-0.03	-0.73
Pebble	0.45	0.56
Gravel	0.31	0.52
Sand	-0.72	0.00
Expl. Var	3349756	3232778
Prp. Totl	0.152	0.147

Factor Loadings (Varimax normalized): Principal components		
	Factor - 1	Factor - 2
Depth	0.34	0.17
Near bed velocity	0.39	-0.15
Average velocity	0.53	-0.56
Distance to the bank	0.29	0.24
Rocky bank	0.43	-0.56
Eroded bank	0.36	0.39
Stabilized bank	-0.79	-0.08
Shade	-0.20	0.57
Factor 1: margens estabilizadas; areia; velocidade média; vegetação submersa Factor 2: pedras; abrigo criado pelos ramos pendentes das ripícolas		
LWD	-0.15	0.48
Stand waves	-0.12	-0.37
Rippled flow	0.44	0.11
Upwelling	-0.39	-0.07
Smooth flow	-0.06	0.27
Silt	-0.23	0.08
Cobbles	-0.03	-0.73
Pebble	0.45	0.56
Gravel	0.31	0.52
Sand	-0.72	0.00
Expl. Var	3349756	3232778
Prp. Totl	0.152	0.147

Curvas de preferência de habitat

Juvenis

Profundidade (cm)

Velocidade (m/s)

Substrato (classes)

Curvas de preferência de habitat

Adultos

Profundidade (cm)

Velocidade (m/s)

Substrato (classes)

Regras e conjuntos fuzzy

Velocity	Depth	Substrate	HSI	
			Juvenile	Adult
VL	VL	L	M	L
VL	VL	M	M	L
VL	VL	H	M	L
VL	VL	VH	L	L
VL	L	L	M	M
VL	L	M	M	M
VL	L	H	L	M
VL	L	VH	L	L
VL	M	L	M	M
VL	M	M	M	M
VL	M	H	M	L
VL	M	VH	L	L
VL	H	L	L	M
VL	H	M	L	M
VL	H	H	L	L
VL	H	VH	L	L
VL	VH	L	L	L
VL	VH	M	L	L
VL	VH	H	L	L
VL	VH	VH	L	L
L	VL	L	H	L
L	VL	M	H	L
L	VL	H	L	L
L	VL	VH	L	L
L	L	L	H	H
L	L	M	H	H
L	L	H	H	H
L	L	VH	L	L
L	M	L	H	H
L	M	M	H	H
L	M	H	M	H
L	M	VH	L	L
L	H	L	L	M

VL – Very Low
L – Low
M – Medium
H – High
VH – Very High
HSI – Habitat Suitability Index

Resultados

Q = 0.4 → 20 m³/s

CASiMiR Fish

$$WUA = \sum_{n=1}^i A_i HSI_i = f(Q)$$

Modelação

Modelação

Modelação

Juvenis

Adultos

Modelação

Modelação

Modelação

Modelação

9 leitos de desova

Modelação

1.5 m³/s

3.3 m³/s

5.8 m³/s

O valor do HSI dos 9 leitos de desova para um caudal de 1.5 m³/s é significativamente superior do que considerando os caudais de 3.3 e 5.8 m³/s ($p < 0.05$; t-student test) com excepção do leito de desova número 2.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de corrente e baixa profundidade, com claridade.
- A época de desova ocorre entre Março e Junho conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de substrato grosseiro. A temperatura da água rondava os 17 graus.
- Não parece haver ligação entre a localização dos leitos de desova e os açudes.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de 1.5 m³/s.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre Março e Junho conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de substrato grosseiro. A temperatura da água rondava os 17 graus.
- Não parece haver ligação entre a localização dos leitos de desova e os açudes.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de 1.5 m³/s.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de substrato grosseiro. A temperatura da água rondava os 17 graus.
- Não parece haver ligação entre a localização dos leitos de desova e os açudes.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de 1.5 m³/s.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos leitos de desova e os açudes.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de 1.5 m³/s.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos **leitos de desova** e os **açudes**.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de 1.5 m³/s.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos **leitos de desova** e os **açudes**.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de **1.5 m³/s**.
- Os leitos de desova estão relacionados com zonas de elevado valor de HSI para o caudal de 1.5 m³/s.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos **leitos de desova** e os **açudes**.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de **1.5 m³/s**.
- Os **leitos de desova** estão relacionados com zonas de **elevado valor de HSI** para o caudal de **1.5 m³/s**.
- Mais de 30 e 20% do habitat juvenil e adulto, respetivamente, representa valores de HSI acima de 0.8.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos **leitos de desova** e os **açudes**.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de **1.5 m³/s**.
- Os **leitos de desova** estão relacionados com zonas de **elevado valor de HSI** para o caudal de **1.5 m³/s**.
- Mais de **30** e **20%** do habitat **juvenil** e **adulto**, respetivamente, representa valores de HSI **acima de 0.8**.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* 2 m³/s) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Considerações finais

- O *Luciobarbus bocagei* tem tendência para ocupar os habitats **junto às margens** com densa **vegetação ripária**, em especial os juvenis. Esta espécie pode ainda ser encontrada em zonas de **substrato grosseiro** e **LWD**;
- Durante a época de desova o *Luciobarbus bocagei* procura zonas de **corrente** e **baixa profundidade**, com **claridade**.
- A época de desova ocorre entre **Março** e **Junho** conforme as condições climáticas desse ano.
- A desova ocorre em zonas de **substrato grosseiro**. A temperatura da água rondava os **17 graus**.
- Não parece haver ligação entre a localização dos **leitos de desova** e os **açudes**.
- O valor de caudal que resulta na disponibilidade máxima de habitat tanto para os juvenis como para os adultos é de **1.5 m³/s**.
- Os **leitos de desova** estão relacionados com zonas de **elevado valor de HSI** para o caudal de **1.5 m³/s**.
- Mais de **30** e **20%** do habitat **juvenil** e **adulto**, respetivamente, representa valores de HSI **acima de 0.8**.
- Deverá ser garantido um valor superior (*i.e.* **2 m³/s**) no início da época de desova que servirá como caudal de atração.

CERIS

CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

TÉCNICO LISBOA

Obrigada

CERIS : Civil Engineering Research
and Innovation for
Sustainability

Rui Cortes, Joaquim Barreira de Jesus, Vítor Pereira, Cátia Santos, Marisa Lopes